

HARİZMİ II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ (TASLAK)

Tarih					Servis Adı						
Hastanın Adı Soyadı					Hastanın Yaşı						
Değerlendirme Gereçesi:	1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği	
Parametreler	Risk Faktörleri					Puan	İlk Değerlendirme				
							Yeniden Değerlendirme				
							(Tarih- Gereçe Numarası)				
						.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	.../.../...	
						()	()	()	()	()	
YAŞ	0- 3 yaş					4	4	4	4	4	4
	4-7 yaş					3	3	3	3	3	3
	8-11 yaş					2	2	2	2	2	2
	12-18 yaş					1	1	1	1	1	1
DÜŞME ÖYKÜSÜ	Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.					2	2	2	2	2	2
HASTALIKLAR (Epilepsi, Mental Retardasyon, Konvülsiyon, Denge bozukluğu, Kooperasyon bozukluğu, Solunum hastalıkları, Senkop/baş dönmesi, Ajitasyon)	Hastalıklardan 1 veya 2 tanesi bulunmaktadır.					1	1	1	1	1	1
	Hastalıklardan 3 veya daha fazlası bulunmaktadır.					2	2	2	2	2	2
GÖRME DURUMU	Görme durumu zayıf (gözlük kullanıyor vb.)					2	2	2	2	2	2
	İleri derecede görme engeli var.					10	10	10	10	10	10
İLAÇ (Hipnotikler, Barbitüratlar, Nöroleptikler, Antidepresanlar, Sedatifler, Antihipertansifler)	Son 1 hafta içinde 1 veya daha fazla riskli ilaç kullanımı var.					2	2	2	2	2	2
EKİPMAN VARLIĞI (IV İnfüzyon, Solunum Cihazı, Kalıcı kateter, Dren, Perfüzator, Pacemaker vb.)	Hastaya bağlı 2 veya daha fazla bakım ekipmanı var.					2	2	2	2	2	2
YÜRÜME VE DENGE (Yürüteç, Koltuk desteği, Kişi desteği vb.)	Ayakta/yürürken fiziksel desteğe ihtiyacı var.					10	10	10	10	10	10
SEDASYON/ANESTEZİ	Hasta post-op/sedasyon/anestezisi ilk 24 saatlik dönemde					3	3	3	3	3	3
	Hasta post-op/sedasyon/anestezisi ilk 48 saatlik dönemde					1	1	1	1	1	1
MENTAL DURUM	Oryantasyon bozuk (konfüze, disoryante, deliryum vb)					3	3	3	3	3	3
YAŞAM BULGULARI	Unstabil					3	3	3	3	3	3
DİĞER	Hasta uygun yatakta yatırılmıyor.					2	2	2	2	2	2
	Ailenin düşme riski konusunda eğitim/bilgilendirme ihtiyacı var.					2	2	2	2	2	2
TOPLAM PUAN											
HEMŞİRE NOTU (Hastanın düşme riski ile ilgili yukarıda bulunmayan önemli bir durum varsa belirtiniz)											
RİSK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU											
Düşük Risk	0 – 9 Puan Arasında										
Yüksek Risk	10 Puan ve Üzeri										
Değerlendirmeyi yapan Hemşire											
Adı-Soyadı:											
İmza:											
NOT:											
* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.											
* Harizmi Düşme Riski Ölçeği yalnızca çocuk (0-18 yaş arası) yatan hastalarda kullanılır.											
* Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.											