

## İtakı II DÜŞME RİSKİ ÖLÇEĞİ (TASLAK)

Tarih:						Yaşı :							
Hastanın Adı Soyadı:						Yattığı Bölüm:							
Cinsiyeti:						Risk Değerlendirme Tarihi:							
Değerlendirme Gerekçesi ve Numarası		1	İlk Değerlendirme	2	Post-op Dönem	3	Hasta Düşmesi	4	Bölüm Değişikliği	5	Durum Değişikliği		
Parametreler		Risk Faktörleri					Puan	İlk Değerlendirme	Yeniden Değerlendirme (Tarih- Gerekece Numarası)				
								.../.../... ( )	.../.../... ( )	.../.../... ( )	.../.../... ( )	.../.../... ( )	.../.../... ( )
YAŞ		60-69					1	1	1	1	1	1	
		70-79					2	2	2	2	2	2	
		80 ve üstü					3	3	3	3	3	3	
BİLİNÇ DURUMU		Bilinç kapalı.					1	1	1	1	1	1	
		Bilinç bozukluğu var (Konfüze, laterjik vb.)					2	2	2	2	2	2	
DÜŞME HİKAYESİ		Son 6 ay içerisinde düşme öyküsü var.					3	3	3	3	3	3	
HASTALIKLAR/KOMORBİDİTELER (Hipotansiyon, vertigo, serebrovasküler hastalık, parkinson hastalığı, uzuv kaybı, nöbet, artrit, osteoporoz, kırıklar)		Hastalıklardan en fazla ikisi bulunmaktadır.					1	1	1	1	1	1	
		Hastalıklardan 3 ve daha fazlası bulunmaktadır.					2	2	2	2	2	2	
HAREKET KABİLİYETİ		Ayakta/yürürken fiziksel desteğe (yürüteç, koltuk desteği, kişi desteği vb.) ihtiyacı var.					5	5	5	5	5	5	
		Ayakta/yürürken denge bozukluğu var.					10	10	10	10	10	10	
		Baş dönmesi var.					2	2	2	2	2	2	
BOŞALTIM İHTİYACI		Üriner/Fekal kontinans bozukluğu var.					1	1	1	1	1	1	
GÖRME DURUMU		Görme bozukluğu var (Katarakt, gözlük kullanımı vb.)					2	2	2	2	2	2	
		İleri derecede görme engeli var.					10	10	10	10	10	10	
İLAÇ KULLANIMI		4'den fazla ilaç kullanımı var.					2	2	2	2	2	2	
		Son 1 hafta içinde riskli en çok 2 ilaç kullanımı var.					2	2	2	2	2	2	
		Son 1 hafta içinde riskli 3 ve daha fazla ilaç kullanımı var.					3	3	3	3	3	3	
EKİPMAN KULLANIMI (Hastanın hareketini kısıtlayan herhangi bir ekipman. Örn: IV infüzyon, foley katater, göğüs tüpü vb.)		Hastaya bağlı 1-2 bakım ekipmanı var.					1	1	1	1	1	1	
		Hastaya bağlı 3 ve üstü bakım ekipmanı var.					2	2	2	2	2	2	
<b>TOPLAM</b>													
<b>RISK DÜZEYİ BELİRLEME TABLOSU</b>													
Düşük Risk		0-9 Puan Arasında											
Yüksek Risk		10 Puan Üzerinde											
							Değerlendirmeyi yapan Hemşire Adı-Soyadı:						
							İmza:						
<b>NOT:</b>													
* Düşmelerin önlenmesine yönelik alınacak önlemler hastada var olan risk faktörlerine göre belirlenmelidir.													
* İtakı Düşme Riski Ölçeği yalnızca yetişkin yatan hastalarda kullanılır.													
* Yüksek risk düzeyinde bulunan hastalar için "Düşme Risk Yüksek Hasta" sembolü kullanılmalıdır.													